

Braunol®



Leczenie ran

- Antyseptyka błon śluzowych
- Antyseptyka ran
- Antyseptyka oparzeń
- Leczenie chorób skóry z superinfekcją
- Antyseptyka oka

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Braunol®

Roztwór do dezynfekcji skóry, antyseptyki błony śluzowej, antyseptyki ran, oparzeń, oka, chorób skóry z infekcją i superinfekcją

Charakterystyka

Braunol® to uniwersalny roztwór wodny powidonu jodu, przeznaczony do wszystkich rodzajów dezynfekcji pacjenta. Substancja czynna powidon jodu (PVP - jod) charakteryzuje się szerokim spektrum skuteczności antybakteryjnej. Eliminuje bakterie, w tym MRSA, zarodniki bakterii, grzyby, drożdże, pierwotniaki i wiele gatunków wirusów. Preparat spełnia wymogi antybakteryjne stawiane przez nowoczesne wymagania higieny i został przebadany zgodnie z wytycznymi DGHM. Brązowe zabarwienie mieszaniny to właściwość nadana przez powidon jodu. Potwierdza to skuteczność roztworu oraz zaznacza zdezynfekowany obszar. Utrata koloru świadczy o spadku aktywności produktu leczniczego. Charakteryzuje się doskonałą tolerancją tkankową. Przyspiesza proces gojenia się ran.

Zastosowanie – koncentrat lub roztwór

- Antyseptyka błon śluzowych
- Płukanie, jako element procedury leczenia ran (np. odleżyny, odleżyny podudziowe, gangrena) oraz okołoooperacyjna profilaktyka przeciwwązaniowa
- Mycie oraz kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne
- Przedoperacyjna dezynfekcja skóry i ran
- Dezynfekcja ran o zwiększonym ryzyku zanieczyszczenia bakteryjnego
- Przed zastrzykami, punkcjami i nacięciami
- Antyseptyczne leczenie poparzonych fragmentów ciała
- Zapobieganie i leczenie infekcji stentów
- Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych prowadzonych na jelicie grubym
- Antyseptyka w zabiegach wycięcia okrężnicy
- Dezynfekcja, płukanie pochwy i sromu przed zabiegami, w tym przed zabiegami chirurgicznymi
- Drenaż cewnika
- Płukanie ran chirurgicznych
- Dezynfekcja złamań otwartych
- Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
- Przedoperacyjna antyseptyka oka
- Płukanie oka po przypadkowym zanieczyszczeniu
- Leczenie w warunkach infekcji wirusowej rogówki i spojówki
- Płukanie ran w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i po ekstrakcji
- Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej.
- przed zastrzykami i punkcjami min. 15 sekund
- przed punkcjami stawów lub jam ciała oraz przed zabiegami 60 sekund

Właściwości

- bakteriobójczy w tym MRSA
- prątkobójczy
- wirusobójczy
- grzybobójczy
- pierwotniakobójczy
- zarodnikobójczy

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inny składnik produktu; nadczynność tarczycy lub innych chorób tarczycy; syndrom opryszczkowego zapalenia skóry; przed i po terapii radioaktywnym jodem

Interakcje

Nie należy stosować razem ze środkami dezynfekcyjnymi zawierającymi: rtęć, Skuteczność może zostać obniżona stosując BraunolR z produktami zawierającymi produkty enzymatyczne do leczenia ran, srebro, taurolidyny i nadtlenek wodoru. Unikać u pacjentów przechodzących terapię litową.

Ostrzeżenia specjalne

U pacjentów z łagodnym wolem guzkowym, autonomicznym gruczolakami lub po chorobie tarczycy, stosować tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń: na powierzchni nie większej niż 10% do 14 dni. Unikać częstego stosowania u pacjentów przechodzących terapię litową. U dzieci do 6 miesięcy stosowanie powinno być bardzo ograniczone ze względu na niemożność całkowitego wykluczenia ryzyka wywołania niedoczynności tarczycy. Nie dopuścić do przypadkowego dostania się preparatu do ust dziecka.

Okres ważności

Okres ważności preparatu leczniczego Braunol® po pierwszym otwarciu wynosi 12 miesięcy

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen ,Niemcy

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie nr 13026

Szczegółowe i dokładne wskazówki dotyczące zastosowania Braunolu znajdują Państwo w naszym materiale pt: Złoty Standard

Dostępne opakowania

Numer katalogowy

butelka 30ml	19676
butelka 100ml	19677
butelka 250 ml z atomizerem	18342
butelka 1000 ml	18311



Braunol® – skład

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne: 7,5g powidonu jodu (10% dostępnego jodu)