

Instrukcja dekontaminacji MDRO – pacjenci chodzący

Produkty:

Prontoderm® Foam (pianka), Prontoderm® Nasal Gel (żel do nosa), Prontoderm® Shower Gel (żel pod prysznic), ProntOral®, środki do dezynfekcji powierzchni, Prontosan® Wound Irrigation Solution (roztwór do przemywania ran, dla pacjentów z ranami)



Stosować przez 5 dni:



Mycie włosów:

Wcierać Prontoderm® Foam we włosy raz na dobę. Użyć ilość odpowiednią do długości włosów.

Czas ekspozycji: 3 – 5 minut



Pielęgnacja nosa:

Przemywać nos 3 razy na dobę wymazówką ((usunąć strupy, skrzepiny)), następnie wprowadzić żel Prontoderm® Nasal Gel do nosa używając nowej wymazówki do każdego nozdrza.



Mycie ciała:

Mycie ciała pod prysznicem raz na dobę przy użyciu żelu Prontoderm® Shower Gel. Zmoczyć ciało i włosy wodą, a następnie rozprowadzić myjką porcję żelu mieszczącą się w dłoni Prontoderm® Shower Gel na powierzchni ciała (stosować również do mycia ucha zewnętrznego, pępka i okolicy narządów płciowych).

Czas ekspozycji: 1 minuta

Następnie spłukać Prontoderm® Shower Gel wodą.



Płukanie jamy ustnej:

Płukać jamę ustną 3 razy na dobę stosując 10 ml preparatu ProntOral®, przepłukać gardło.



Zalecenia ogólne:

- Protezy stomatologiczne czyścić za pomocą preparatu ProntOral® (jednorazowa szczoteczka do zębów!).
- Myć zęby jednorazową szczoteczka.
- Przemyć okulary oraz aparaty słuchowe czystą ściereczką zwilżoną pianką Prontoderm® Foam.
- Tekstylia pozostające w kontakcie ze skórą (np. pościel, bielizna, ręczniki) należy zmieniać codziennie. W razie potrzeby prać w temperaturze 60 °C.
- Po zakończeniu dekontaminacji, nie używać ponownie żadnych produktów do pielęgnacji i higieny stosowanych przed i podczas procesu dekontaminacji (np., pasta do zębów, dezodorant w kulce, krem); należy je wyrzucić.



Dezynfekcja powierzchni:

Istotne jest, by wszystkie powierzchnie dotykowe mające kontakt z pacjentem (łazienka, włączniki światła, kłamki, stół nocny) poddać dezynfekcji przy pomocy środka do dezynfekcji powierzchni (np., chusteczki HBV Meliseptol®).

Leczenie ran:

Do leczenia ran należy użyć roztworu do irygacji ran o działaniu dekontaminującym (Prontosan®).

Instrukcja dekontaminacji MDRO – pacjenci leżący

Material:

Prontoderm® Foam (pianka), Prontoderm® Nasal Gel (żel do nosa), ProntOral®, środki do dezynfekcji powierzchni, Prontosan® Wound Irrigation Solution (roztwór do przemywania ran, dla pacjentów z ranami)



Stosować przez 5 dni:



Mycie włosów:

Wcierać Prontoderm® Foam we włosy raz na dobę. Użyć ilość odpowiednią do długości włosów.

Czas ekspozycji: 3 – 5 minut



Pielęgnacja nosa:

Przemywać nos 3 razy na dobę wymazówką (usunąć strupy, skrzepiny), następnie wprowadzić żel Prontoderm® Nasal Gel do nosa używając nowej wymazówki do każdego nozdrza.



Mycie ciała:

Nałożyć piankę Prontoderm® Foam na wilgotną myjkę i zwilżyć całą powierzchnię ciała. Używać oddzielnej myjki do każdej części ciała. Nigdy nie zanurzać myjki dwukrotnie w naczyniu.

Czas ekspozycji: 1 minuta

Pianka Prontoderm® Foam może pozostać na skórze, tworząc barierę przeciwdrobnoustrojową przez okres do 24 godz.



Płukanie jamy ustnej:

Płukać jamę ustną 3 razy na dobę stosując 10 ml preparatu ProntOral® i przepłukać gardło, bądź nałożyć na całą powierzchnię jamy ustnej przy pomocy wymazówki do pielęgnacji jamy ustnej.



Zalecenia ogólne:

- Protezy stomatologiczne czyścić za pomocą preparatu ProntOral® (jednorazowa szczoteczka do zębów!).
- Myć zęby jednorazową szczoteczka.
- Przemyć okulary oraz aparaty słuchowe czystą ściereczką zwilżoną pianką Prontoderm® Foam.
- Tekstylia pozostające w kontakcie ze skórą (np. pościel, bielizna, ręczniki) należy zmieniać codziennie. W razie potrzeby prać w temperaturze 60 °C.
- Po zakończeniu dekontaminacji, nie używać ponownie żadnych produktów do pielęgnacji i higieny stosowanych przed i podczas procesu dekontaminacji (np., pasta do zębów, dezodorant w kulce, krem); należy je wyrzucić.



Dezynfekcja powierzchni:

Istotne jest, by wszystkie powierzchnie dotykowe, mające kontakt z pacjentem (łazienka, włączniki światła, kłamki, stolik nocny) poddać dezynfekcji przy pomocy środka do dezynfekcji powierzchni (np., chusteczki HBV Meliseptol®).



Leczenie ran:

Do leczenia ran należy użyć roztworu do irygacji ran o działaniu dekolonizującym (Prontosan®).